

Op 28.6

0-29

A-376356-KP



**ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫЕ
В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОБИТАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Предисловие

Развитие цивилизации все большее число видов фауны и флоры ставит на грань исчезновения.

Многие из видов животных находятся на грани вымирания – печальная, но далеко не новая информация. Каждый цивилизованный человек регулярно с ней сталкивается. Но что он при этом испытывает? Чаще всего лишь легкие переживания по поводу того, что в скором времени милые пушистые зверьки или красивые грозные хищники останутся только на фотографиях или в виде чучел в музеях, и практически никто не задумывается о настоящей опасности их вымирания.

Строительство городов, уничтожение лесов, загрязнение среды – лишь часть деятельности человека для обеспечения собственного комфортного существования. Но при этом слишком редко учитываются ставшие очевидными параллели: в природе взаимосвязано абсолютно все – если исчезает одно звено экосистемы, страдают и остальные. Уничтожение животных подрывает этот хрупкий баланс, и в итоге, мы необратимо теряем ценнейшие ресурсы, необходимые нам самим.

Даже если в обычной жизни человек крайне редко сталкивается с вымирающими видами, то это не означает, что он не может способствовать сокращению их популяции. Оставленный в лесу мусор, незатушенный костер, слитая в реку грязная вода или бензин – все это несет в себе опасность для природных экосистем.

Даже небольшие усилия отдельно взятого человека, направленные на сохранение редких исчезающих видов животных, не менее важны, чем масштабные. Сознательное отношение сотен тысяч людей к природе поможет положительно повлиять на сохранение объектов животного мира и принять меры по восстановлению их популяций.

Министерство
лесного и охотничьего хозяйства
Оренбургской области

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»



ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА

NYCTALUS LASIOPTERUS

(SCHREBER, 1780)

Отряд: Рукокрылые Chiroptera

Семейство: Гладконосые Vespertilionidae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 4. Редкий, с невыясненным современным распространением и статусом вид.

Краткое описание

Самая крупная летучая мышь местной фауны. Длина тела 84-104 мм, длина предплечья 63-69 мм, масса 41-76 г. Мордочка укорочена; уши небольшие, мясистые, козелок булавовидный. Крыло длинное и узкое. Эпиблема хорошо выражена, с поперечной хрящевой перегородкой. Шерсть густая, волосы средней длины с бледными основаниями. Окраска от палево-рыжей до каштаново-рыжей, брюхо незначительно светлее спины; за ушами пятна темной шерсти.

Распространение

Обитает в Европе, от Северной Франции на западе до лесостепного Приуралья на востоке; к северу до Московской и Нижегородской об-

ластей, на юге до Марокко, Ирана и Закавказья. На территории Оренбургской области все известные регистрации приурочены к Бузулукскому бору в пределах одноименного района.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

Современное распространение на территории области не известно. Дифференцированные учёты численности с другими видами рукокрылых в подходящих местообитаниях не проводились. Благодаря низкой вероятности обнаружения убежищ, гигантская вечерница мало уязвима для прямого уничтожения. Основную угрозу популяциям вида представляет уничтожение старовозрастных дуплистых деревьев.



РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ

DESMANA MOSCHATA

(LINNAEUS, 1758)

Отряд: Насекомоядные Insectivora

Семейство: Кротовые Talpidae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 3. Редкий, локально распространенный вид.

Краткое описание

Тело плотное, вальковатое, шея короткая, мордочка оканчивается длинным подвижным хоботком. Лапки небольшие, на задних конечностях имеются плавательные перепонки. Хвост сплюснен с боков, при плавании выполняет функцию руля. Шерсть густая, блестящая, сверху буроватая, снизу

серебристо-белая. Структура волоса позволяет удерживать значительное количество воздуха, что обеспечивает ненамокание меха в воде.

Распространение

В Оренбургской области встречается в бассейне р. Урал ниже г. Оренбург, а также по р. Самара и некоторым её притокам. Совре-

менное распространение в области связано с поймами рек Урал и Илек, где отмечалась у сёл Рычковка и Зубочистка в Переволоцком районе, Городище и Краснохолм в Оренбургском районе, Нижнеозерное и Илек в Илекском районе. В окрестностях с. Илек известны места обитания по озерам Солдатово, Старица, Мухраново. Кроме того, наблюдалась в устье р. Каргалка в Оренбургском районе, а также по рекам Иртек и Кинделя при их впадении в р. Урал в Ташлинском районе. Из рек волжского бассейна современных данных о распространении нет.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

В среднем течении р. Урал, большая часть

которого лежит в пределах Оренбуржья, на начало 1970-х гг. численность оценивалась в 2 тыс. особей. По данным управления охотничьего хозяйства области, в этот же период в четырёх заказниках насчитывалось около 900 особей выхухоли. Современных данных нет. Сокращение ареала и численности связывают с сетевым рыболовством, хозяйственным преобразованием пойм, выпасами скота, загрязнением водоемов. Конкурентом выхухоли в заселении нор является ондатра. К естественным факторам, отрицательно влияющим на численность, следует отнести также высокое весеннее половодье. Иногда по этой причине численность может сокращаться наполовину.

ПЕРЕВЯЗКА

VORMELA PEREGUSNA
(GUELLENSTAEDT, 1770)

Отряд: Хищные Carnivora

Семейство: Куницевоу Mustelidae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 1. Вид с невыясненным современным распространением и статусом, возможно исчез.



Краткое описание

По внешним признакам схожа со степным хорьком, но отличается пестротой окраски: наличием черного, желтого, бурого и белого цветов. Подбородок и широкая полоса вокруг рта белые. По морде через глаза проходит темно-бурая полоса, через лоб, по ушам и темени - белая, перед ушными раковинами - черная. Спина буроватая или желтая с различной величины и формы светлыми и темными пятнами. Брюхо и конечности темно-бурые, местами со светлыми пятнами. Хвост двухцветный, на конце черный. Передвигается прыжками, выгнув спину дугой.

Распространение

Единственная современная регистрация относится к крайнему юго-западу области. Здесь в 1992 г. перевязка отмечена в бассейне р. Чаган на территории Первомайского района. Из-за неразработанности внутривидовой таксономической структуры и неопределен-

ности границы между выделяемыми формами, встречи этих зверьков в пределах области могут относиться к разным подвидам.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

Сведений о численности вида на территории области нет. По материалам из других районов ареала, в естественных местообитаниях на 1 км маршрута приходится 0,1–0,3 следа. Из лимитирующих факторов наибольшее значение имеют сплошная распашка и многократная обработка земель сельскохозяйственного назначения, уничтожение сусликов, составляющих основу пищевого рациона, выпас скота на неудобьях, строительство дорог, нефте- и газопроводов, каналов и канав, увеличение численности бродячих собак, обработка сельскохозяйственных культур инсектицидами, которые по пищевым цепям попадают в организм хищника и сокращают продолжительность его жизни.



АВДОТКА BURHINUS OEDICNEMUS (LINNAEUS, 1758)

Отряд: Ржанкообразные Charadriiformes
Семейство: Авдотковые Burhinidae
Категория редкости и статус в пределах
Оренбургской области: Категория 3. Редкий вид.

Краткое описание

Крупный кулик. Сверху в окраске оперения преобладают песочные тона с многочисленными продольными пестринами. На крыле характерные темные и белые полосы и пятна. Глаза желтые, большие. Ноги трехпалые. Самки отличаются менее четкими полосами на крыле. Молодые еще более тусклой окраски, чем самки. Вес - около 500 г, размах крыльев достигает 80 см.

Распространение

В России область распространения простирается от долины среднего течения р. Дон до левобережной долины р. Урал. Зарегистри-

рованы залеты в Сибирь. В Оренбургской области в небольшом числе гнездится в массивах бугристых песков в районе с. Новоилецк Соль-Илецкого района, а также в песчаных массивах у с. Илек Илекского района.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

Численность авдотки в области, составляет, вероятно, от 10 до 20 пар. К основным лимитирующим факторам относятся: сокращение пригодных местообитаний, гибель кладок и птенцов при выпасе скота, а также разорение гнезд хищниками.



БАЛОБАН FALCO CHERRUG (GRAY, 1834)

Отряд: Соколообразные Falconiformes
Семейство: Соколиные Falconidae
Категория редкости и статус в пределах Оренбургской области: Категория 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Современные регистрации единичны.

Краткое описание

Крупнее вороны. Крылья сравнительно широкие, хвост длинный. Взрослые птицы рыжевато-бурые сверху, беловатые, с каплевидными темными пестринами снизу. «Усы» на боках головы выражены слабо. Молодые темнее, с широкими продольными пестринами на груди и брюхе. Голос - звонкое «кьякк-кьякк» или «кеек-кеек-кеек».

Распространение

Оренбуржье целиком входит в гнездовой ареал вида. Для первой половины XX века упоминается как редкий гнездящийся вид области, без каких-либо конкретных сведений о местах размножения. Мигрирующие весной, осенью и кочующие во второй половине лета особи в 1980-е гг. многократно отмечались в Илекском, Беляевском, Акбулакском, Соль-Илецком и Гайском (Губерлинские горы) районах. Начиная с середины

1990-х гг. численность балобана на территории области резко сократилась. Никаких современных сведений о гнездовании, или встречах в сезон размножения, нет. За последние два десятилетия имеется единственная регистрация в период сезонных миграций: в первой половине октября 2004 г. взрослый балобан наблюдался в полёте между домами многоэтажной застройки в Степном посёлке г. Оренбурга.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

В XIX веке был обычен. Суммарная гнездовая численность в Оренбуржье на начало прошедшего десятилетия оценивалась в 5-10 пар. На миграциях – в несколько десят-

ков особей. Из множества неблагоприятных факторов, с которыми связывают современное катастрофическое падение численности балобана, наиболее существенными для территории области являются ухудшение гнездовых и кормовых условий, в частности – резкое сокращение численности основной добычи – малого суслика. Наиболее существенное влияние на современное состояние популяций вида оказало изъятие птенцов перед вылетом из гнёзд и их контрабандный вывоз, браконьерский отлов на миграционных маршрутах и в районах зимовок с целью последующего использования в качестве ловчих птиц в странах Аравийского полуострова.

БЕРКУТ

AQUILA CHRYSAETOS
(LINNAEUS, 1758)

Отряд: Соколообразные Falconiformes

Семейство: Ястребиные Accipitridae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 3. Редкий гнездящийся, пролетный и зимующий вид.



Краткое описание

Самый крупный из местных орлов. Размах относительно узких, острых крыльев превышает 2 м. Хвост длинный, слегка закругленный. Общий тон окраски оперения темно-бурый. Заостренные перья затылка и зашейка золотисто-желтоватые. У молодых хвост белый, с широкой темной полосой по краю. Лапы сильные, с крупными мощными когтями. Голос – хриплый клекот «кьек-кьек-кьек». Очень осторожен.

Распространение

В Оренбуржье лесами долины среднего течения р. Урал проходит южная граница гнездового ареала вида. В первой половине XIX века был очень обычен в предгорьях Южного Урала, окружающих их гористых и холмистых степях и на Общем Сырте. В настоящее время беркут остаётся редким гнездящимся, пролётным и зимующим видом области. За последние два десятилетия

гнездование установлено в следующих местах: в Болотовских сосновых борах близ одноимённого села в Кваркенском районе, в Бузулукском бору на водоразделе рек Черталык и Карачаев Муштай, в пойме р. Сакмара у с. Чебеньки в Оренбургском районе, на истоках р. Вязовка в Губерлинских горах; здесь же найдено нежилое гнездо. Кроме того, взрослые птицы в сезон размножения и наблюдались в пойме р. Урал у г. Верблюжка в Беляевском районе, по Сакмагушскому долу близ с. Акчура на хребте Шайтантау, а молодой беркут в послегнездовое время отмечен в левобережной долине р. Урал на восточной окраине участка «Айтуарская степь» государственного природного заповедника «Оренбургский» в Кувандыкском районе. Зимующих встречали в пойме р. Самара близ ст. Бузулук, в пойме р. Урал у с. Подстёпки в Илекском районе, в долине р. Уртабурты на юге Беляевского района.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

В XIX веке был сравнительно обычен. Со-временные гнездовые находки в разных районах области позволяют пересмотреть более ранние оценки численности в сторону увеличения до 10-15 пар, учитывая также, что не обследованными остаются многие потенциально пригодные для обитания этого

хищника участки. Значительное сокращение численности в XX веке связано со сведением высокоствольных лесов, сокращением кормовой базы, резко возросшим беспокойством, особенно в период размножения. Возможна также гибель в зимнее время в капканах, поставленных у привады и от отравленных приманок.



БОЛЬШОЙ КРОШНЕП NUMENIUS ARQUATA (LINNAEUS, 1758)

Отряд: Ржанкообразные Charadriiformes

Семейство: Бекасовые Scolopacidae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 2. Сокращающийся в численности вид.

Краткое описание

Самый крупный из местных куликов, по размерам больше вороны. Общий тон окраски слегка рыжеватый, на темени нет выраженных продольных полос. Крылья снизу белые. Самки окрашены так же, как и самцы, но немного крупнее и имеют более длинный клюв. У молодых клюв короче и прямее, чем у взрослых птиц. Вес - около одного килограмма, размах крыльев - 80 - 100 сантиметров.

Распространение

В Оренбургской области регулярно встречается на участках «Буртинская степь» (Беляевский район) и «Ащисайская степь» (Светлинский район) государственного природного заповедника «Оренбургский» и на прилегающих территориях. Гнездится в пойменных лугах по р. Шарлык у районного центра Шарлык, а также на озёрах Шалкаро-Жетыкольской группы в Светлинском районе. В мае 2001 г. был довольно

обычен в песчаной степи в окрестностях пос. Новоилецк в Соль-Илецком районе. В апреле 2012 г. токующего самца наблюдали в пойме р. Бурты в Беляевском районе, а в мае гнездо с кладкой найдено в степи у с. Советское в Акбулакском районе.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

Гнездовая численность на территории области не превышает, вероятно, одной-двух сотен пар. В Шалкаро-Жетыкольском озерном районе в благоприятные периоды может гнездиться до нескольких десятков пар этих птиц, а численность на пролете достигает нескольких сотен особей. Тенденция изменения численности - негативная. Во многих известных местах обитания происходит уменьшение количества гнездящихся пар. К основным лимитирующим факторам относятся трансформация местообитаний, влияние фактора беспокойства на гнездовании и охотничий пресс на путях миграций.

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК

AQUILA CLANGA

(PALLAS, 1811)

Отряд: Соколообразные Falconiformes

Семейство: Ястребиные Accipitridae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 3. Редкий гнездящийся и пролетный вид.

Краткое описание

Орел средней величины. Размах крыльев не превышает 170-180 см. Окраска взрослых однотонная, черно-бурая. Молодые - черновато-бурые, со светлыми, каплевидными пестринами сверху. Изредка, в том числе на территории Оренбургской области (Бузулукский бор), встречаются окрашенные в золотисто-желтый цвет особи. Полет быстрый и ловкий. Голос - звонкое «кьяк-кьяк-кьяк» и различные трели. Осторожен.

Распространение

Территория Оренбуржья целиком входит в гнездовой ареал вида. В первой половине XIX века был нередок в предгорьях Урала и окружающих их равнинных лесах. В последней четверти прошлого столетия - обычный гнездящийся вид лесов среднего течения р. Урал, низовой р. Илек, долины р.Сакмара, а также северо-западных лесостепных районов области. За последние десятилетия имеется всего несколько регистраций в сезон размножения. Единственное жилое гнездо с двумя оперившимися птенцами в этот период найдено в начале августа 2005 г. в лесах уральской поймы у с. Мухраново в Илекском районе. Здесь же взрослая птица с кормом наблюдалась двумя



годами ранее, что свидетельствует о постоянном участке гнездования. В сезон размножения 2006 и 2007 гг. регулярно наблюдался в пойме р. Урал у с. Кзылжар в Беляевском районе, а в 2011 г. у пос. Партизанский в Бузулукском бору. На весеннем пролёте в конце марта 2001 г. отмечен в пойме р. Илек близ с. Корниловка в Акбулакском районе, на осеннем - в конце первой декады октября 2001 г. у северного берега оз. Шалкар-Ега-Кара в Светлинском районе. Обитатель лесной и лесостепной зон. Населяет высокоствольные леса вблизи водоемов и увлажненных мест, рек, озер, болот. Гнездится только на деревьях.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

Судя по имеющимся словесным оценкам, в XIX веке был сравнительно обычен. В настоящее время для Оренбургской области, территория которой лежит в краевой части гнездового ареала, является естественно редким видом. Современная численность, по ориентировочной оценке, не превышает 25-30 пар. Ее сокращение в XX веке может быть связано с вырубкой высокоствольных лесов, возросшим уровнем фактора беспокойства, ухудшением кормовых условий.

ДРОФА

OTIS TARDA TARDA

(LINNAEUS, 1758)

Отряд: Журавлеобразные Gruiformes

Семейство: Дрофиные Otidae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 2. Вид с сокращающейся численностью.



Краткое описание

Крупная птица, размером примерно с индюка. Самцы крупнее самок. Общая окраска коричневато-охристых и рыжих тонов с темными пестринами. Весной у самца «усы» из удлиненных белых перьев. У самок на крыле меньше белого цвета за счет большей площади рыжих кроющих. Молодые похожи на самок, но более блеклые. Полный брачный наряд приобретают в возрасте от 3 до 6 лет. Вес взрослых самцов от 7 до 12 кг.

Распространение

В Оренбуржье за последнее десятилетие дрофа неоднократно отмечалась на участке «Таловская степь» государственного природного заповедника «Оренбургский» в Первомайском районе. Летом 2007 г. здесь отмечена самка с птенцами. Известны также регистрации на участке «Буртинская степь» в Беляевском районе. Существует небольшая гнездовая группировка дроф на сельскохозяйственных землях в долине р. Малая

Хобда южнее пос. Шкуновка в Акбулакском районе. В конце мая 2008 г. самка дрофы с двумя маленькими птенцами обнаружена в долине р. Букабай в Оренбургском районе, а в начале мая 2007 г. одиночный самец держался на территории бывшего Орловского полигона в Беляевском районе. По балке Шыбынды в Соль-Илецком районе одиночная птица встречена 25 августа 2001 года. На востоке области в качестве пролетного вида известна для окрестностей оз. Шалкар-Ега-Кара в Светлинском районе.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

Численность дрофы в области невелика, вероятно, не больше сотни птиц. К основным лимитирующим факторам относятся антропогенные преобразования биотопов и низкий коэффициент воспроизводства. Отмечается гибель дроф при столкновении с высоковольтными линиями. Не исключена браконьерская добыча отдельных птиц.



ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЛАЯ ЛАЗОРЕВКА CYANISTES CYANUS (PALLAS, 1770)

Отряд: Воробьишобразные Passeriformes

Семейство: Синицевые Paridae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 4. Статус редкий, с недостаточно выясненным распространением и статусом подвид.

Краткое описание

Населяет лиственные и смешанные леса. Предпочитает заболоченные приречные и озерные уремы. Гнездо, как и у других синиц, в дупле. Часто использует дупла мелких дятлов, пустоты. Лоток обычно выстилается конским волосом, пухом. В кладке до 13 белых с красным крапом яиц. Питается насекомыми. Голос — громкое «тци-ци-ци-тррж». Песня — мелодичная трель «цилилили».

Распространение

Преимущественно северные районы европейской части России. В Оренбуржье — лесостепная часть; кочующие — по всей территории. В последней четверти XIX века изредка

гнездилась по р. Сакмару близ Оренбурга. В настоящее время считается нерегулярно гнездящимся видом пойменных лесов рек Ика, Большой Ик, Кандыза и Сакмары, однако эти сведения не могут считаться абсолютно достоверными, так как не сопровождаются описаниями найденных гнезд, кладок или выводков.

Численность и лимитирующие факторы

Даже в центральных районах гнездового ареала европейская белая лазоревка всегда имела спорадическое распространение и невысокую численность. Еще в большей степени это характерно для территории Оренбуржья, где находятся краевые участки ареала

подвида. В период осенне-зимних кочевок ее численность в пойме р. Урала составляет от 0,2-0,3 до 0,5 особей на 1 кв.км. В некоторые годы количество кочующих белых лазоревок может повышаться, что отмечено как в XIX

веке — зимой в 1879-1880 года, так и в настоящее время — осенью 1976 года. Однако таксономический статус этих птиц нуждается в уточнении.

СРЕДНИЙ ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ

DENDROCOPOS MEDIUS MEDIUS
(LINNAEUS, 1758)

Отряд: Дятлообразные Piciformes

Семейство: Дятловые Picidae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 4. Краеарейный, с недостаточно выясненным современным распространением и статусом подвида.

Краткое описание

Черно-белый дятел средних размеров. Лоб рыжевато-пепельный, темя и затылок ярко-красные. Бока рыжеватые с продольными черными штрихами, подхвостье розовое. Очень подвижная птица, за что получил народное название «вертлявый дятел». Голос — крик-трель «кик-кик-кирикикик».

Распространение

Имеется единственное упоминание о гнездовании среднего пёстрого дятла на территории Оренбуржья — в начале 1950-х гг. в Бузулукском бору. В разные числа июня 2006 г. два средних пестрых дятла (возможно, одна и та же особь) отмечены в сосновом лесу у р. Солончанка юго-восточнее пос. Болотовск в Кваркенском районе. При этом характер пребывания наблюдавшихся птиц остался не выясненным.

На большей части ареала ведёт оседло-кочующий образ жизни. Населяет широколи-



ственные, в первую очередь дубравы, и хвойно-широколиственные леса, старые заброшенные сады и парки. Гнездо, как и все другие дятлы, выдалбливает в дереве. В кладке от 4 до 6 яиц белого цвета. Насиживание длится около 14 суток. Птенцы покидают дупло в возрасте около трёх недель.

Численность, лимитирующие факторы и угрозы

В Оренбургской области численность не известна, лимитирующие факторы не изучены. В центральных и западных частях ареала лимитирующими факторами являются интенсификация лесного хозяйства, фрагментирование дубрав, особенно в сочетании с их омоложением, низкие зимние температуры, непогоды в период выкармливания птенцов, разорение гнезд куницами, возможно, сонями, конкуренция с большим пестрым дятлом за дупла в период их строительства.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЮВИК

ACCIPITER BREVIPES
(SEVERTZOV, 1850)

Отряд: Соколообразные Falconiformes

Семейство: Ястребиные Accipitridae

Категория и статус в пределах Оренбургской области:

Категория 3. Редкий гнездящийся, локально распространенный вид.



Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу Вы можете почитать в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 77-92-66