


Op72.9
Ч-58
А-411530



Чибилёв А.А


ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ НОВОРОССИИ И ДОНБАССА



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
1. ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ	6
2. ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ	22
3. ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА	34
4. ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА	61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	75
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	76





ПРЕДИСЛОВИЕ

Регионы Новороссии и Донбасса, расположенные в нижней части бассейнов Днепра и Северского Донца на протяжении XVIII-XX веков изучались отечественными естествоиспытателями. Именно здесь, в бассейнах нижнего течения Днепра и Северского Донца, на рубеже XIX–XX веков закладывались основы отечественного заповедного дела. Первые опыты В.В. Докучаева по созданию целинных степных заповедных участков – научных станций на опытных полях Деркульского и Великоанадольского лесничеств на территории современных ЛНР и ДНР, а также создание первого частного заповедника Ф.Э. Фальц-Фейна были «прологом» будущей заповедной системы СССР и современной России. Именно эти опыты в Донбассе и Причерноморье высоко оценивались созданной в 1912 г. Постоянной Природоохранительной комиссией Императорского Русского географического

общества и были включены в первый план географической сети заповедников России, представленный в 1917 г. В.П. Семёновым-Тян-Шанским.

В настоящее время идет активный процесс интеграции природно-заповедного фонда четырех субъектов РФ в федеральную систему особо охраняемых природных территорий. Обобщение многолетнего опыта деятельности заповедников Новороссии и Донбасса позволит разработать оптимальные режимы сохранения степных экосистем. Рассмотрены перспективы оптимизации и расширения заповедных резерватов.

Четыре региона Российской Федерации в Донбассе и Новороссии охватывают ландшафты на юго-западе степной зоны страны общей площадью около 108,9 тыс. км². В физико-географическом отношении на этой территории представлены юг Среднерусской возвышенности, Донецкий кряж, Приазовская возвышенность, равнины и низменности Причерноморья и Приазовья. Высокая степень хозяйственной освоенности территории, связанная в первую очередь с развитием горно-добывающей промышленности и интенсивным расширением растениеводства и животноводства, уже в конце XIX века обострила экологические проблемы, касающиеся утраты естественного потенциала ландшафтного и биологического разнообразия и необходимости проведения мероприятий по мелиорации земель, сохранения последних участков первозданных ландшафтов и развития научных основ степного природопользования. Анализ научного наследия в области географических наук, полученного в этом регионе за два века, свидетельствует о всероссийском и мировом значении этой территории, послужившей своеобразным научно-практическим полигоном для отечественного степеведения, школой степного лесоразведения и колыбелью отечественного заповедного дела [1; 2].

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Левобережная часть Херсонской области целиком лежит в пределах южно-степного Причерноморья, охватывающего дельту, долину Днепра и Днепровско-Молочанское междуречье. Поверхность равнины плоская и характеризуется слабым эрозионным расчленением. Только приречные территории рассечены оврагами и неглубокими балками, а идеальную равнинность водораздела Днепра и реки Молочной нарушают замкнутые понижения-поды со слабо выраженными склонами. Северную часть Херсонской области занимает возвышенное междуречье Днепра и Молочной – Днепровско-Молочанская южностепная область Причерноморской низменности [3]. В ландшафтно-типологическом отношении здесь преобладают плакоры-ровняди, придолинные балки-раздолы и водораздельные равнинно-подовые местности.

Большую часть юга и юго-востока Херсонской области занимает Присивашско-Приазовская южностепная низменная равнина. В геоморфологическом отношении она представляет собой верхнеплиоценовую террасу. Здесь преобладают лёссовые равнины – классические ровняди с темно-каштановыми почвами. Поверхность террасовых ровнядей усеяна множеством больших и малых подов – относительно глубоких замкнутых котловин с выраженными склонами.

На юге Херсонской области узкая приморская полоса – это Северный Присивашский район, верхнеплиоценовая терраса, расчлененная подами-долинами, современным заливом Сиваша, а также

лиманами восточной части Каркинитского залива. Ландшафтную структуру Северного Прииславья определяет сочетание трех типов местности: равнинно-волнистых приморских террас, приморских долинно-подовых солончаковых равнин, приморских солончаков.

Своеобразным мелководным заливом Азовского моря является Сиваш с многочисленными лиманами и озерами. Сиваш имеет сильно изрезанную береговую линию с многочисленными островами и полуостровами, его акватория представляет собой сложный лабиринт заливов и протоков самых замысловатых очертаний.

Юго-западная часть Херсонской области – это Днепровская террасово-дельтовая равнина, в которой обособливаются два района: Нижнеднепровский плавневый и Нижнеднепровский (Алешковский) песчаный [4].

Днепр в низовьях имеет широкую пойму и современную дельту, которая прослеживается ниже разрушенной в 2023 г. плотины Каховского водохранилища. Строительство, а затем разрушение плотины Каховского гидроузла привело к катастрофическим изменениям ландшафтов долины нижнего течения Днепра.

На левобережье Днепра от Новой Каховки до Кинбурнской косы на расстояние около 150 км простирается Нижнеднепровский песчаный район. Всего на этом пространстве выделяется семь больших песчаных массивов общей площадью 161 тыс. га. В середине XX века песчаные массивы левобережья Днепра стали полигоном для масштабных лесомелиоративных работ, целью которых было закрепление развеваемых бугристых песков.

Современный природно-заповедный фонд Херсонской области представлен разнообразными объектами общегосударственного значения (биосферные заповедники, национальный природный парк). Так, в 2023 г. статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) имели 76 территорий и объектов. В настоящее время идет процесс реорганизации и вхождения этих объектов в государственную заповедную систему Российской Федерации.

Для истории и современной практики заповедного дела в степной зоне Евразии исключительно важное значение имеет заповедник «Аскания-Нова», расположенный в причерноморско-приазовских степях. Его основателем стал Ф.Э. Фальц-Фейн (1863–1920). В 1898 г. по совету ботаника И.К. Пачоского (1864–1942) участки целинной степи в 500 и 100 га были объявлены «защитными на вечные времена». В 1919 г. помещичье хозяйство Аскания-Нова было преобразовано в Народный заповедный парк Украины. В 1921 г. специальным декретом Аскания-Нова была провозглашена государственным степным заповедником. В 1927 г. было утверждено «Положение о государственном заповеднике «Чапли» (так назывался в то время заповедник). На него была возложена задача «сохранять и всесторонне изучать целинную южную степь, ее природу и производительные силы сельского хозяйства наиболее засушливой части Украины; сохранять, изучать и акклиматизировать в условиях степи животных и растения степной зоны...» [5]. С 1 января 1930 г. все учреждения заповедника были объединены в Степной институт, который возглавил В.В. Станчинский. В 1932 г. Степной институт был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт гибридизации и акклиматизации животных. В 1984 г. «Аскания-Нова» решением ЮНЕСКО внесена в список биосферных резерватов.

Площадь биосферного заповедника составляла 33,3 тыс. га. В его состав вошли заповедная степь (площадью 11 298,8 га), буферная зона и зона сельскохозяйственного землепользования.

Черноморский государственный заповедник охватывает участок северо-восточного побережья Черного моря. Он был создан в 1927 г. Его границы неоднократно менялись. В состав первого кластера заповедника входят бугристо-песчаные частично облесенные ландшафты первой надпойменной террасы Днепра. Второй кластер заповедника образуют ландшафты степных участков Потиевка и Ягорлыкский Кут, расположенные на второй надпойменной террасе Днепра. В третий кластер входят острова Тендра, Смоленый, Бабин, Орлов, Долгий, Круглый, Конский, на которых имеются самые разнообразные станции для обитания богатой орнитофауны и млекопитающих [6].

Азово-Сивашский национальный парк охватывает обширную территорию и акваторию общей площадью 51,7 тыс. га. Он протянулся с запада на восток на 94 км, с севера на юг – на 33 км. Идеи сохранения водных и наземных ландшафтов Сиваша возникли еще в конце XIX века, когда биологические ресурсы Северного Приазовья подвергались катастрофическому истощению [7].

В августе 1957 г. здесь было создано государственное заповедно-охотничье хозяйство, площадь которого составляла более 34 тыс. га. В 1975 г. Азово-Сивашское государственное заповедно-охотничье хозяйство получило статус водно-болотных угодий международного значения как важнейшее место обитания водоплавающих птиц. В связи с этим вокруг заповедных островов и полуостровов функционировала охранный зона площадью 23,3 тыс. га. В 1993 г. на базе бывшего заповедно-охотничьего хозяйства был создан Азово-Сивашский национальный природный парк.





СТРОГОНОВСКИЕ ОСТРОВА (ВС)

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу Вы можете почитать, обратившись в отдел краеведения Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20.